

# Gewürztraminer

Offizieller Sortenname – Synonyme<sup>1</sup>  
Gewürztraminer – Savagnin rose aromatique

Herkunft<sup>4</sup>  
Frankreich (Alsace)

Verbreitung<sup>4</sup>  
Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Italien, Portugal, Tschechische Republik, Schweiz, Rumänien, Republik Moldau, Ukraine, Kroatien, Ungarn, Spanien, Kanada, Vereinigten Staaten von Amerika, Argentinien, Brasilien, Südafrika, Australien, Neuseeland

Charakteristische Merkmale

## Phänologie<sup>4</sup>

Austrieb: früh  
Blütezeit:  
Farbumschlag:  
Reifezeitpunkt: zweite Epoche – früh

## Morphologie<sup>3</sup>

Triebspitze: stark behaart  
Blatt: klein  
Traube: kurz – kompakt  
Beeren: klein – kurz elliptisch

## Vegetative Merkmale

Wuchsform:  
Wüchsigkeit<sup>4</sup>: gut  
Fruchtbarkeit<sup>4</sup>: wenig  
Verrieselung<sup>4</sup>: anfällig  
Holzfarbe<sup>5</sup>: braun-gelb

Empfindlichkeit/ Widerstandsfähigkeit  
Krankheitsanfälligkeit<sup>4</sup>: anfällig gegenüber echtem Mehltau  
Frosthärte<sup>4</sup>: anfällig

Nutzung der Trauben  
Weinproduktion

Bemerkungen

---


Quellenangaben

<sup>1</sup>Nationale Datenbank Schweiz

<sup>3</sup>Datenerhebung 2008

<sup>4</sup>Dictionnaire encyclopédique des cépages, P. Gallet


<sup>5</sup>Revue Suisse Vitic, Arboric, Hortic. Vol 27 (1) : 1995



Triebspitze



Oberseite



Unterseite

# Ampelographisches Beurteilungsblatt (gemäss O.I.V.)

Sorte	<b>Gewürztraminer</b>	Standort	<b>Pully, Vaud</b>
Datum	<b>Sommer 2008</b>	Nutzung	<b>Sammmlung</b>

## Triebspitze und junger Trieb während der Blüte

Code	Beschreibung	Bonitierung	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	Triebspitze	Vollständig offen					X				
003	Intensität der Anthocyanfärbung der Wollhaare an der Triebspitze	Mittel					X				
004	Dichte der Wollbehaarung an der äussersten Triebspitze	Stark							X		
051	Farbe der Blattoberseite (4. Blatt der Triebspitze)	Bronziert			X						
053	Dichte der Wollbehaarung zw. Den Hauptnerven, Blattunterseite	Stark							X		
056	Dichte der Borstenbehaarung d. Hauptnerven d. Blattunterseite	Mittel					X				
007	Farbe der Rückseite der Internodien	Grün und rot		X							
008	Farbe der Bauchseite der Internodien	Grün	X								
009	Farbe der Rückseite der Nodien	Grün und rot		X							
010	Farbe der Bauchseite der Nodien	Grün	X								
012	Dichte der Borstenbehaarung der Internodien	Fehlend oder sehr schwach	X								
015-1	Bereich der Anthocyanfärbung auf den Knospenschuppen	Basal		X							
015-2	Intensität der Anthocyanfärbung auf den Knospenschuppen	Stark							X		
016	Anzahl aufeinanderfolgender Ranken	2 oder weniger	X								
151	Geschlecht der Blüte	Zwittrig			X						
152	Höhe des ersten Blütenstandes	1. oder 2. Nodium	X								
155	Fruchtbarkeit an den 1.-3. Augen kurzer Schnitt	Mittel					X				
351	Wuchskraft des Triebes	Mittel					X				

## Ausgewachsenes Blatt zwischen Beerenansatz und Weichwerden der Beeren

Code	Beschreibung	Bonitierung	1	2	3	4	5	6	7	8	9
065	Grösse der Blattspreite	Klein			X						
067	Form der Spreite	Kreisförmig				X					
068	Anzahl Lappen	5			X						
070	Bereich der Anthocyanfärbung auf den Hauptnerven Blattoberseite	Nur Stielansatz			X						
072	Waffelung der Spreite	Mittel					X				
074	Profil im Querschnitt (Blattmitte)	V-förmig		X							
075	Blasigkeit der Blattoberfläche	Mittel					X				
076	Form der Zähne	Beiderseits konvex			X						
077	Grösse der Zähne relativ zur Blattgrösse	Sehr klein	X								
078	Länge der Zähne relativ zu ihrer Breite an ihrer Basis	Kurz			X						
079	Grad der Stielbuchtöffnung / Überlappung	Halb überlappend					X				
080	Form der Stielbuchtbasis	Klammerförmig		X							
081-1	Zähne in der Stielbucht (mind. 10%)	Fehlend	X								
081-2	Stielbuchtbasis durch Nerven begrenzt	Unbegrenzt	X								
083-1	Form der Basis der oberen Seitenbuchten	Leierförmig			X						
083-2	Zähne in den oberen Seitenbuchten	Fehlend	X								
084	Dichte der Wollbehaarung zw. den Hauptnerven (Blattunterseite)	Mittel					X				
087	Dichte der Borstenbehaarung d. Hauptnerven der Blattunterseite	Schwach			X						

## Traube und Beeren bei der Reife

Code	Beschreibung	Bonitierung	1	2	3	4	5	6	7	8	9
202	Länge der Traube ohne Stiel	Kurz ca. 12 cm			X						
204	Kompaktheit	Kompakt							X		
206	Länge des Stiels der Haupttraube	Kurz ca. 5 cm			X						
208	Form der Traubenhauptachse	Konisch		X							
209	Anzahl Schultern (Flügel)	1-2 Schulterm		X							
220	Grösse der Beeren	Klein		X							
223	Form der Beeren	Lang elliptisch				X					
225	Hautfarbe besonnener Beeren	Rosa		X							
230	Farbe des Fruchtfleisches	Ungefärbt	X								
236	Besonderheit des Geschmacks	Muskatgeschmack		X							
241	Ausbildung von Samen	Vollständig			X						